

“Le sida a un visage de femme”

- En Afrique sub saharienne, près de 60 % de toutes les personnes vivant avec le VIH sont des femmes
- Dans certaines régions d’Afrique et de la Caraïbe, les adolescentes ont cinq fois plus de chances d’être contaminées par le VIH que les adolescents
- Le sida est la première cause de décès parmi les femmes afro américaines âgées de 25 à 34 ans
- Au Botswana, plus de la moitié (54 %) de toutes les femmes âgées de 25 à 29 ans sont séropositives
- Sans une augmentation considérable des activités de prévention, 45 millions de personnes DE PLUS seront contaminées par le VIH d’ici 2010



www.global-campaign.org

Pourquoi les femmes sont à risque :

- Biologie :
 - Une plus grande surface de muqueuse exposée
 - Sperme = plus de VIH que les sécrétions vaginales
 - Maturité incomplète du corps des jeunes femmes
- Économie :
 - Dépendance financière. Impossibilité de quitter les partenaires.
- Culture :
 - L'infidélité des hommes est acceptée, pas celle des femmes
 - Les violences, l'ignorance sur la sexualité et sur les inégalités de genre rendent la négociation sur le préservatif difficile, voire impossible



www.global-campaign.org

Les violences domestiques augmentent les risques liés au VIH :

- Le viol peut provoquer des saignements génitaux ; utilisation du préservatif improbable
- Les abus sexuels limitent la négociation sur la protection – y compris le sexe sans risque
- Les maltraitances subies dans l'enfance peut conduire à une prise de risques plus importante à l'âge adulte
- Révéler sa séropositivité peut déclencher des violences domestiques



www.global-campaign.org

Le lien est établi....

Les femmes séropositives ont 3 fois plus de chances d'avoir un partenaire violent que les femmes séronégatives

Celles de moins de 30 ans ont 10 fois plus de chances de vivre des situations de violences que leurs pairs séronégatives (Tanzanie, Maman, 2001)

Les hommes qui ont des comportements abusifs sont plus susceptibles à avoir des rapports sexuels en dehors des relations stables et de contracter des IST (Inde, Martin et al, 1999)

Les femmes dont les partenaires sont violents ont 2 fois plus de chances que les autres d'être séropositives (Afrique du Sud, Jewkes et al, 2004)



www.global-campaign.org

Que pouvons-nous faire ?

- Faire en sorte que les services prenant en charge les femmes maltraitées prennent en compte les abus sexuels et les besoins liés au VIH
- Faire en sorte que les services de prise en charge du VIH prennent en compte les questions de violence (actuelles et anciennes)
- Aider les femmes à se protéger en leur garantissant
 - ✓ Égalité des genres et protection juridique de leurs droits à la sécurité, à l'emploi et aux soins.
 - ✓ Éducation, opportunités économiques, soutien et services sociaux ciblés pour elles et leurs enfants
 - ✓ Des méthodes de prévention du VIH/SIDA contrôlées par elles, comme les microbicides...



www.global-campaign.org